

RUBÉOLA MATERNO-FETAL: AVALIAÇÃO DA PERDA AUDITIVA POR AUDIOMETRIA DE TRONCO CEREBRAL

Autor: Pedro Luiz Cóser

Orientador: Dr. Luiz Celso Pereira Vilanova

Este estudo mostra a caracterização da perda auditiva decorrente de Rubéola Materno-fetal encontrada em 50 crianças com idades variando entre 6 meses e 10 anos.

Utilizou-se a Audiometria de Tronco Cerebral para se avaliar as respostas auditivas aos estímulos com “click” e com “tone pip” de 1000 Hz.

O tipo de perda mais freqüente foi o sensorial. O grau de perda mais freqüente foi o profundo. As perdas foram simétricas na maioria das vezes, especialmente quando em um dos lados a perda era de grau profundo. As respostas ao “click” e ao “tone pip” de 1000 Hz foram semelhantes na maior parte das vezes porém, em alguns casos em que nenhuma resposta foi obtida com o “click”, obteve-se resposta com o “tone pip” de 1000 Hz.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA

CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM DISTÚRBIOS DA COMUNICAÇÃO HUMANA

Autor: Pedro Luiz Cóser

Orientador: Dr. Luiz Celso Pereira Vilanova

Título: Rubéola Materno-fetal: avaliação da perda auditiva por Audiometria de Tronco Cerebral.

Tese de Mestrado em Distúrbios da Comunicação Humana

Santa Maria, 30 de outubro de 1995.